


사무실에 사용 :

약속 날짜 : _____

약속 시간 : _____



환자 BreathTek™ 준비
음주 운전 테스트를 위한 요소 해 파일로리

a BreathTek™ 시험에 대한 준비 상태 :

먹지 마세요 또는 1 시간 전에 시험을 치르 술.

기권 2 주 동안 다음 약품의 사전 테스트를 위해 :

O를 모든 항생제

O를 프로톤 펌프 억제제 (PPI) Prilosec® 등과 같은, 그리고 Prilosec OTC®, Prevacid®, Aciphex®, Protonix®, Zegerid® 및 Nexium®

PPIs, esomeprazole, lansoprazole, pantoprazole 포함된 rabeprazole omeprazole O를 일반 버전

Pepto Bismol® 등과 같은 O를 비스무스 준비

H2를 antagonists 프로톤 펌프 저해제에 대한 교체 될 수 있습니다. 이러한 약물 검사 결과에 영향을 미치지 않는 Zantac®, Tagamet®, Pepsid® 및 Axid® 등이있다.

시험을 관리하기 전에, 모든 환자는 다음 질문을해야한다 :

당신이 지난 한 시간 동안 먹지, 술을 마신 적이 있습니까?

어떤 항생제를 사용하고 계십니까, 프로톤 펌프 억제제 또는 창연 준비?

당신 PKU 페닐알라닌 제한하거나, 다이어트에 당신은 마 (1 Aspartame, 감미료 다이어트 청량 음료에 사용되는 구성 요소의)?

치료제를 확인하는 테스트를 할 때 :

시험 완료 후 4 주 치료 요법을 시행해야한다. 또한 위의 조건이 적용됩니다.

기타 고려 사항 :

antimicrobials의 먹었, 2 주 이내에 프로톤 펌프 억제제, 그리고 창연 사전 준비를 허위 부정적인 결과를 줄 수 있습니다 BreathTek™ UBT를 수행합니다. 조기 진단을 위해 테스트 숨을 컬렉션 시간 marginally 허위 부정 긍정적인 결과를 가진 환자에 대한 이어질 수있다. 헬리코박터 파이 로리균 감염의 임상 징후가있는 경우 새 샘플 또는 다른 방법으로 재시험, 암시합니다. 한 허위 양성 반응으로 헬리코박터 heilmannii이나 환자에 achlorhydria 등 생물과 관련된 위염 나선형 urease에 발생할 수 있습니다. 약 Pranactin® 구연산 페닐알라닌의 청량 음료는 다이어트 콜라에 상응하는 수량이 포함되어었습니다. BreathTek™ UBT 환자의 연령은 18 세 미만의 공부되지 않았다. 제발 절차, 예방을 위해 사용하기 위해 작성하는 약도를 참조 및 제한.

의료 회사 Meretek 고급, 비 -, 비 - 방사성 숨을 침략적 테스트 및 계측의 개발에 종사하고있다. BreathTek Meretek 진단의 상표입니다, Inc. Pranactin Meretek 진단의 등록 상표입니다, Inc. UBiT 오츠카 제약 주식 POCon의 등록 상표입니다 오츠카 제약 주식 레브 8의 상표입니다 / 2005